

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGO -

DLP 31-5-85510214

☎ (95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 58

du 28 MAI 1985

V I G N E



G

Grappes séparées

Bonne sortie de grappes pour la plupart des cépages qui sont actuellement entre les stades G et H



H

Boutons floraux séparés

MILDIU : Prévoir un traitement avant floraison

Bien que les foyers primaires soient peu nombreux (3 foyers ont été découverts : Pianiccia, Ghisonaccia et Patrimonio), les grappes devenant très réceptives au mildiou pendant la floraison, il est nécessaire d'effectuer un anti-mildiou dès cette semaine.

OIDIUM : surveillez le Carignan

De nombreuses tâches sur feuilles, des dégâts sur grappes sont visibles sur ce cépage dans de nombreux secteurs. Dans ces situations intervenir d'urgence.

Si la lutte concerne oidium et mildiou vous pouvez utiliser :
-phosethyl al + folpel + fenarimol = ALLIANCE
-cymoxanil + propinèbe + triadimefon = DIAMETAN B

TORDEUSES DE LA GRAPPE : ne pas traiter

Les glomérules sont trop peu nombreux pour l'instant.

CICADELLES VERTES : à surveiller

Les sorties sont localement élevées, mais une intervention n'est justifiée que si on observe 100 larves pour 100 feuilles.

P. 14

OIDIUM sur pêcher :

Les conditions climatiques sont favorables et on observe des dégâts sur feuilles et fruits. De nombreux produits sont utilisables :

- soufre mouillable ou en poudrage
- benomyl BENLATE
- binapacryl AMBOX 50
- bupirimate..... NIMROD
- chimométhionate..... MORESTAN
- dinocap KARATHANE
- ditalimphos PLONDRADOR
- fenarimol..... RUBIGAN 4
- methylthiophanate PELT
- pyrazophos AFUGAN
- triforine..... SAPROL, DENARIN, FUNGINEX
- triadimefon..... BAYLETON 5
- penconazol..... TOPAZE C
- nitrotal-isopropyl + soufre mouillable.KUMULAN

TEIGNE de l'olivier :

Des vols de teigne sont déjà observés. Utiliser début floraison ou tout de suite après un insecticide à base de **bacillus thuringensis** afin de préserver les auxiliaires.

ALEURODES sur agrumes :

Les sorties d'aleurodes ont été observées en MARANA, sur ALERIA, GHISONACCIA et sur la région d'AJACCIO. Attendre la fin de la floraison pour effectuer un traitement. Préférer les produits à base de **methidathion** ou de **methomyl**. S'il y a des acariens utiliser l'**omethoate**.

* Que faire après une chute de grêle ?...

Intervenir dans les 24 heures avec des spécialités à base de folpel (NS), captane (NS) ou dichlofluanide (EUPARENE).

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1985 - Toute reproduction, même partielle est soumise à notre autorisation.